

Cistolitolapaxia

instrucciones posoperatorias

¿Qué es?

La cistolitolapaxia es un procedimiento mínimamente invasivo por el cual se fragmentan los cálculos vesicales en trozos más pequeños para su fácil eliminación.

Después de la operación, ¿qué debo esperar?

Cuando se despierte de la cirugía, es posible que tenga el catéter colocado. Este debe permanecer en su lugar hasta dos días después de la cirugía. Es posible que orine con frecuencia, sienta ardor al orinar y presente sangre en la orina.

- La orina roja o rosada es común durante los primeros días posteriores a la cirugía. La orina no debe ser de color rojo intenso, tener el aspecto de jugo de tomate ni presentar coágulos.

Dieta y actividad después de la cirugía

- Después de la cirugía, se le administrarán líquidos claros, como caldo, jugos o gelatina. En la medida en que pueda tolerarlo, volverá a su dieta normal.
- Distensión abdominal, estreñimiento o hinchazón abdominal: tome un laxante Colace de venta libre. Si continúa sin defecar después de 24 horas, es seguro usar un supositorio Dulcolax. No haga demasiada fuerza durante la defecación.
- Se le pedirá que camine poco después de la cirugía para que la circulación, la respiración y la función intestinal vuelvan a la normalidad. Esto es muy importante para prevenir la aparición de coágulos sanguíneos.
- Camine por lo menos tres veces al día, aumentando gradualmente la distancia.
- Puede ducharse después de la cirugía.
- Es común presentar orina con tinte rosado.

Si presenta alguno de los siguientes síntomas, por favor comuníquese al consultorio:

- Fiebre superior a los 38 °C (100.4 °F), dolor, náuseas o vómitos no controlados.
- Dificultad para orinar.
- Coágulos de sangre en la orina.

Por favor llame a nuestro consultorio al 503-561-7100 si tiene preguntas. El horario de atención es de 8 a. m. a 5 p. m. En caso de emergencia, llame al 911.

SHMG-2689 457282