

Biopsia de próstata con aguja

instrucciones posteriores al procedimiento

¿Qué es?

Una biopsia de próstata con aguja es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extracción de muestras de tejido de la glándula prostática para detectar cáncer.

Después de una biopsia de próstata con aguja, ¿qué debo esperar?

- Cuídese después de la biopsia de próstata. Limite sus actividades y trate de no hacer nada extenuante durante 24 a 48 horas.
- Camine por lo menos tres veces al día, aumentando gradualmente la distancia.
- Es de esperar que haya sangre roja brillante en la orina y en las heces durante el primer o segundo día. Llame a nuestro consultorio de inmediato si nota coágulos significativos en la orina que puedan o no estar obstruyendo el flujo de orina, o si el sangrado rectal continúa después de 48 horas. Puede esperar sangre leve en la orina (rosa a rojo claro) hasta por un mes después de la biopsia de próstata. Aumente el consumo de líquidos si nota este cambio en el color de la orina.
- Puede anticipar la presencia de sangre en la eyaculación hasta dos meses después de la biopsia de próstata. La eyaculación puede aparecer de color óxido.
- Llame si tiene escalofríos o fiebre de 100.4 °F, esto podría ser un indicio de una infección y debe informarse a nuestro consultorio de inmediato.
- Por favor, asegúrese de tomar su última píldora antibiótica la noche de su biopsia, según las indicaciones de su médico y como se indica en sus instrucciones.
- Debido a los efectos anticoagulantes, no tome aspirina, ibuprofeno, Aleve o cualquier otro antiinflamatorio para el dolor. Puede tomar Tylenol si es necesario. Si toma anticoagulantes (Plavix, Coumadin, aspirina, etc.) consulte a su urólogo antes de reanudar estos medicamentos.

Por favor, llame a nuestro consultorio al 503-561-7100 si tiene preguntas. El horario de atención es de 8 a. m. a 5 p. m. En caso de una emergencia, llame al 911.

SHMG-2689 457298